



INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SIEROLOGIA DELLA RABBIA NEI CANI E NEI GATTI

Quando si viaggia in un paese a rischio di rabbia è obbligatorio avere, oltre che una vaccinazione valida, anche una determinazione del titolo anticorpale. Il test sierologico è tuttavia più rigoroso della determinazione della validità di una vaccinazione (3 anni per tutti i vaccini antirabbici per cani e gatti in uso in Svizzera). Per ridurre al minimo la frequenza di titoli insufficienti, si raccomanda la seguente procedura:

- L'immunizzazione di base dovrebbe **S E M P R E** consistere di 2 dosi somministrate ad intervalli di 7-10 giorni di distanza. In questo modo si ottengono titoli più alti e che si mantengono più a lungo nel tempo al di sopra del valore limite di 0,5 UI.
- La determinazione del titolo deve essere effettuata secondo il regolamento (1 mese dopo la prima vaccinazione valida) e sempre al più presto possibile. Dopo 4 mesi con una sola vaccinazione già il 25% dei cani non possiede più un titolo sufficiente. Questa percentuale aumenta linearmente con il tempo trascorso dalla prima vaccinazione!¹
- Per la vaccinazione nell'uomo, è raccomandato un richiamo annuale al fine di assicurare un titolo sufficiente per un periodo di tempo più lungo. La vaccinazione di richiamo è più sicura negli animali se l'ultima vaccinazione risale a più di 2 mesi prima.

¹ Maggiori dettagli possono essere trovati nel seguente articolo: Zanoni R.G., Bugnon P., Deranleau E., Nguyen T.M.V., Bruegger D.: Walking the dog and moving the cat: Rabies serology in the context of international pet travel schemes. Schweiz.Arch.Tierheilkd. 2010, 152: 561-568

Cordiali ringraziamenti
Centro svizzero della rabbia

<Tw-mits9_3b.docx>